


**A kolkhiszi borostyán (*Hedera colchica*)  
 Magyarországon ültetett változatai és fajtái**




*Hedera colchica* var. *dentata*




*Hedera colchica* var. *dentata* 'Sulphur Heart'



*Hedera colchica* var. *dentata*  
 'Dentata Variegata'



*Hedera colchica* 'My Heart'



*Hedera colchica*  
 convar. *arborescens*



## Hedera colchica C.KOCH

A Kolchiszi borostyán-- nálunk gyakoribb a kaukázusi borostyán elnevezés, de ez a név a H. psthovii- ra érvényes-- a Kaszpi tengertől délre eső területeken és nyugat felé a Kaukázus vidékén és Törökország ázsiai részén őshonos . Caspar Koch német botanikus írta le, aki élőhelyéről, az ősi Kolhiszról nevezte el . Már az 1800-a évek második felében eljutott Ny Európába és onnan került be Magyarországra. is. Korábban használatos nevei H. roegneriana ,H. coriacea, H. cordifolia, ( H. caucasigena H.robusta)

Az alapfaj levelei sötétzöldek, szívesvéllúak, nem karéjosak, 6-12x6-8cm -esek ép .szélűek ,hegyes csúcsúak, az időskori alak levelei lándzsásak .Lassabban növekedik (–4-6cm –es ízek) és nehezebben szaporítható mint a var. Dentata ( 'Dentata')ezért ritkábban telepítik, pedig jó télálló.

A *Hedera colchica var Dentata*: nagy –15-22x1517 cm-, borsózöld színű , világos erezetű, levelei tojásdadok, --szabálytalan- szív alakúak ,vagy gyengén karéjosak A levél széle ritkásan fogazott. A felkúszó hajtás levelei lelógók az idősebb levelek ( két- három évig élnek )szélükön behajlók Az internódiumok (ízek) hossza 6-10cm,.Szára bíbor-barna, levélnyele zöldes bíbor színű. Jellemző erős illata a zeller illatára emlékeztet. Pikkelyszőrei rőt-barnák, gyakran két irányban megosztott sugársejtekkkel.

Már a múlt század hetvenes éveitől ültetik , először arborétumokban de kertekben is .Üde termőhelyeken érzi jól magát, esetenként ki is vadulhat. Száraz, fagynak kitett helyeken nem kúszik fel a támaszra, és nem virágozik, nem terem.

Szép bokorformát különösen a 'Dendroides ' fajtából lehet előállítani de ezek nálunk még nem, (Hollandiában gyakran látható) találhatóak meg. Könnyebben gyökeresedik a H. helix időskori hajtásánál A Soroksári Botanikus Kertben a 'Dentata variegata' és a 'Sulphur Heart' fajták bokorformája is megtalálható

Fajtái:

'Sulphur Heart' A levél alakja lényegében azonos a változat alakjával, a lemez középső részén szabálytalan szív alakú sárga folt látható , még feltűnőbb az erek sárga színe ezen a területen .

Társnevei : 'Striata', Paddy's Pride'

'Dentata Variegata' Levelei nem karéjosak, elszórtan aprón fogazottak, vagy épek, a világoszöld alapon ezüstös foltok és krémsárga szegély található . , bőrnemű matt felületű.

'My Heart '-Nálunk üvegházban tartott(SBK)szív alakú fajta, Angliában télálló, ( valószínű azonos az alapfajjal ).

**Saját tapasztalatok:**